



Die folgenden Angaben beziehen sich auf die USDA-Klimazone 7b

Durchlässiges Substrat, Mischung aus Akadama, Bims und Humus im Verhältnis 3.2:1

| Baumsorte | Arbeiten | Bemerkungen | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|----------------|-------------------------|--|--------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Granatapfel | Umtopfen | Jungpflanzen alle 1 bis 2 Jahre, sonst → | Alle 3 bis 4 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | Standort | Nicht winterhart!! - Schutz erforderlich | | | ☀ | | | ☀ | | | ☀ | | | |
| | | Kalthaus wäre optimal | | | | | | | | | | | | |
| | Pinzieren | dünne Äste das ganze Jahr über schneiden – 1 | | | | P | P | P | P | | | | | |
| | Schnitt | | starke Äste | | | | | | | | | | | |
| | Drahten | | | | | | | | | | | | | |
| | Düngen | Mineralischen oder organischen Dünger | | | | | | | | | K | | | |
| | Gießen | Gießmenge - (wenig), + (mässig), ++ (oft) | - | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | - | - |
| | Vermehrung | S = Samen; St = Stecklinge; A = Abmoosen | | | | | | | St | St | | | | |
| | Krankheiten / Maßnahmen | Blattläuse, weiße Fliege, Spinnmilben – 2 | | | | | | | | | | | | |
| Besonderheiten | | | | | | | | | | | | | | |

Legende :

| | |
|---|--|
| K | ---> kaliumbetont |
| ☀ | Sonnig (direkte Sonneneinstrahlung) |
| ☀ | Halbschattig (heller Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
| ☀ | Schattig (Standort mit gedämpftem Licht) |

Notizen :

1 – Punica G. blüht an den Astenden der neuen Triebe, wird Wert auf Blüte gelegt, sollte der Schnitt zurückhaltender erfolgen!

2 – Blattläuse und die weiße Fliege können erfolgreich mit handelsüblichen Mittel bekämpft werden. - Bewährt haben sich

hier Lizetanstäbchen! Dem Befall von Milben kann schnell mit erhöhter Luftfeuchtigkeit entgegengetreten werden.