

Cotoneaster – Zwergmispel Pflegekalender



Gut durchlässiges Substrat aus Akadama, Lavagranulat und Bims im Verhältnis 3:1:1

Umtopfen in der kalten Jahreszeit (zeitiges Frühjahr oder Spätherbst) vermindert die Gefahr von Nematodenbefall!

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die USDA-Klimazone 7b

Baumsorte	Arbeiten	Bemerkungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Zwergmispel	Umtopfen		alle 3 bis 4 Jahre											
	Standort	Z. sind winterhart, leichter Schutz reicht				☀			☀		☀			
	Pinzieren													
	Schnitt	dünne Äste über das ganze Jahr schneiden	dicke Äste											
	Drahten	Formen und Drahten das ganze Jahr möglich												
	Düngen	mineralische und organische Dünger												
	Gießen	Gießmenge - (wenig), + (mässig), ++ (oft)	-	-	+	+	++	++	++	++	+	+	-	-
	Krankheiten/Maßnahmen													

Der Cotoneaster sollte nicht zu nass überwintert werden!

Legende :

☀	Sonnig (direkte Sonneneinstrahlung)
☀	Halbschattig (heller Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung)
☀	Schattig (Standort mit gedämpftem Licht)

Notizen :

Während der Blüte mit dem Düngen aussetzen!
