

Acer buergerianum – Dreispitzahorn Pflegekalender



Mischung aus Akadama, Lavagranulat und Kanuma im Verhältnis 3:3:1 Jungtriebe 10 bis 15 cm herauswachsen lassen und dann auf ein bis zwei Blattpaare kürzen.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die USDA-Klimazone 7b

		/				/_								
Baumsorte	Arbeiten	Bemerkungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Umtopfen	Jungpflanzen jedes Jahr, sonst $ ightarrow$		Alle 2 bis	3 Jahre									
ahorn	Standort	Keinen zu heißen Standort wählen				/ <u>*</u>			***		談			
		nicht winterhart!! Frostschutz erforderlich				/								
	junge Pflanzen	Ab August nicht mehr schneiden, dann pinzierer	1		/	'		,		Р	Р			
tza	ältere Pflanzen				Die frischen Triebspitzen gleich nach Öffnen der Knospen herausb					rechen.*				
	Schnitt	dünne Äste über das ganze Jahr schneiden	dicke	Äste										dicke Äste
<u>eis</u>	Drahten	Vorsicht der Draht wächst schnell ein				/								
<u> </u>	Düngen	mineralische und organische Dünger			ab Austriebsbeginn									
	Gießen	Gießmenge - (wenig), + (mässig), ++ (oft)	-	-	+	/ ++	++	++ \	++	++	++	+	-	-
	Krankheiten/Maßnahmen													

Mit jedem weiteren Austrieb genauso verfahren wie oben beschrieben!

Aufgrund der Laubfülle muss im Sommer u.U. an heißen Tagen mehrmals gegossen werden.

Legende:

ſ	SHE	
	**	Sonnig (direkte Sonneneinstrahlung)
I	黨	Halbschattig (heller Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung)
I	*	Schattig (Standort mit gedämpftem Licht)

Notizen:

Beim Standort gibt es widersprüchliche Angaben! Erfahrungsgemäß sollte er in den heißen Monaten halbschattig stehen!

* Warten bis die ersten zwei Blätter heraus gewachsen sind, dann mit der Pinzette entfernen!