

# Euonymus europea – Pfaffenhütchen Pflegekalender



Die folgenden Angaben beziehen sich auf die USDA-Klimazone 7b

Mischung aus Akadama, Bims und Humus oder Blumenerde (1) im Verhältnis 2:2:1

Pfaffenhütchen können vollsonnig stehen, sollten aber im Sommer vor der heißen Mittagssonne geschützt werden.

Baumsorte	Arbeiten	Bemerkungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>Pfaffenhütchen</b>	Umtopfen	Alle 2 Jahre												
	Standort	Winterhart, leichter Schutz ist ausreichend				☀			☀		☀			
	Pinzieren	störende Triebe das ganze Jahr über entfernen												
	Schnitt	An gr. Schnittstellen Wundpaste aufbringen! -2				////	////	////	////					
	Drahten	3				////	////	////	////					
	Düngen	Nach der Blüte mit dem Düngen beginnen – 4												
	Gießen	Gießmenge - (wenig), + (mäßig), ++ (oft)	-	-	+	++	++	++	++	++	++	+	-	-
	Vermehrung	S = Samen; St = Stecklinge; A = Abmoosen		S	S				St				S	
	Krankheiten / Maßnahmen	Blattläuse; Mehltau – 5												
	Besonderheiten	kalkliebend; etwas salzempfindlich; <b>sehr giftig</b>												

**Legende :**

//// //// ----> jeweilige Maßnahme auch noch möglich

☀	Sonnig (direkte Sonneneinstrahlung)
☀	Halbschattig (heller Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung)
☀	Schattig (Standort mit gedämpftem Licht)

Gleichmäßig feucht halten, verträgt sehr gut Leitungswasser.

**Notizen :**

- 1- Jedoch keinen Torf verwenden! - 2 – Günstigste Zeit vor dem Austrieb einen ordnenden Schnitt vorzunehmen!
- 3 – Drahten bevor der Saftdruck im belaubten Zustand zu hoch wird, sonst werden die Äste spröde und brüchig!
- 4 - Wenn Früchte ansetzen erstmalig mit organischem Flüssigdünger düngen und zeitgleich festen organischen Dünger auflegen.
- 5 – Blattläuse mit handelsüblichen Mitteln bekämpfen. Mehltau ist oft ein Anzeichen einer geschwächten Pflanze! Hier reicht es wenn eventuell das Substrat gewechselt oder die Pflegegewohnheiten angepasst werden.